



Scheda tecnica

RACIX

SOLUZIONE NPK CON AMINOACIDI

DESCRIZIONE

RACIX sviluppa un potente sistema radicale (radici e peli assorbenti), che aiuta a superare lo stress vegetativo al momento del trapianto e incrementa la crescita vegetativa della radice. Si tratta di un prodotto totalmente naturale, privo di fitormoni. La sua applicazione è compatibile con altri prodotti Naturax Force. Il nostro prodotto si distingue per la sua efficacia, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Investire in un buon programma di gestione radicale non solo garantisce raccolti più abbondanti e di qualità, ma protegge anche la salute del suolo e favorisce pratiche agricole più responsabili, orientate alla tutela dell'ambiente.

BENEFICI

Come regolatore della crescita vegetativa, inibisce la dominanza apicale e stimola l'accestimento e lo sviluppo di nuovi germogli. Aumenta la quantità di vitamine e zuccheri, stimola l'accumulo di proteine nei cereali e accelera l'accumulo di grassi nelle oleaginose.

Migliora la formazione delle radici; il prodotto esercita un potente effetto stimolante sulla crescita radicale, accelera la fotosintesi, aumenta l'efficienza dei macronutrienti, stimola l'assorbimento dei nutrienti e accelera la fioritura e la maturazione delle piante.

COMPOSIZIONE MINIMA E DOSI

Composizione:

Aminoacidi liberi	4,0% p/p
Azoto (N) totale	5,0% p/p
Azoto (N) organico	1,2% p/p
Azoto (N) ammoniacale	1,2% p/p
Anidride fosforica (P₂O₅)	4,0% p/p
Ossido di potassio (K₂O)	4,0% p/p
Ferro chelato EDDHA (o-o)	0,07% p/p
pH	4,5-5,0
Densità	1,16-1,20 kg/L

Dosi

Applicazione mediante fertirrigazione per tutti i tipi di colture.

Orticole: 5 L/ha, 2-3 applicazioni, intervallo di 10-12 giorni.

Colture legnose: 7-8 L/ha, 2-3 applicazioni (intervallo di 15 giorni).

Idroponica: 0,5-1 L/m³.

CONSERVAZIONE E COMPATIBILITÀ

Conservare ben chiuso nel contenitore originale e mantenere in luogo fresco.

Evitare l'esposizione all'aria o all'umidità per periodi prolungati.

Può essere utilizzato in miscela con multifertilizzanti e pesticidi (insetticidi, fungicidi).

Non utilizzare insieme a prodotti contenenti rame, solfati, oli minerali o prodotti alcalini (pH > 8), né con miscele bordolesi.

Evitare l'uso a temperature estreme.

Si raccomanda di effettuare una prova di compatibilità e di applicare su una piccola area prima dell'uso per verificare eventuali effetti avversi sulle piante o la formazione di sedimenti.